

Passez vos tests !

Les tests recommandés de dépistage du cancer peuvent vous sauver la vie.

Parlez-en à votre médecin ou au personnel infirmier.

Get your Tests! - French

Tests de dépistage recommandés

25 à 39 ans	40 à 49 ans	50 ans ou plus	GLOSSAIRE
<p>Dépistage du cancer colorectal Découvrez si vous avez un risque élevé de cancer du côlon ou du rectum. Sinon, aucun dépistage n'est encore requis.</p>	<p>Dépistage du cancer colorectal Commencez le dépistage régulier à partir de 45 ans et jusqu'à 75 ans. La décision de réaliser un dépistage chez les personnes de 76 à 85 ans dépend de leurs préférences, espérance de vie, santé générale et antécédents de dépistage. Plusieurs types de tests peuvent être utilisés. Parlez à votre médecin pour savoir quels tests sont les mieux adaptés à votre situation. Indépendamment du test choisi, le plus important est de passer un test.</p>		<p>Dépistage du cancer colorectal Ces tests peuvent prévenir le cancer colorectal ou le détecter à un stade précoce, lorsqu'il peut être plus facile à traiter. Le cancer colorectal peut être prévenu en trouvant un polypeet en l'excisant avant qu'il ne devienne un cancer.</p>
<p>Dépistage du cancer de la prostate Aucun dépistage n'est encore requis.</p>	<p>Dépistage du cancer de la prostate À partir de 45 ans, les hommes à risque élevé, ceux d'origine africaine et ceux dont un membre de la famille proche a eu un cancer de la prostate avant l'âge de 65 ans devraient parler des avantages et inconvénients du dépistage avec un médecin. Les hommes à risque particulièrement élevé (plus d'un parent au premier degré ayant eu un cancer de la prostate avant l'âge de 65 ans) devraient en parler à leur médecin à partir de 40 ans. Ils doivent alors décider s'ils veulent passer un test de dépistage du PSA dans le sang, avec ou sans toucher rectal.</p>	<p>Dépistage du cancer de la prostate À l'âge de 50 ans, les hommes présentant un risque moyen de cancer de la prostate et dont l'espérance de vie est d'au moins 10 ans devraient discuter avec un médecin des risques et des avantages potentiels du dépistage. S'ils décident de le faire, ils devraient passer un test de dépistage du PSA dans le sang, avec ou sans toucher rectal, et discuter avec leur médecin de la fréquence de dépistage recommandée.</p>	<p>Dépistage du cancer de la prostate Les taux de PSA (antigène prostatique spécifique) dans le sang peuvent être plus élevés chez les hommes atteints du cancer de la prostate, en plus des autres pathologies. Un toucher rectal permet à un médecin de déterminer si la prostate présente des masses ou une taille anormale.</p>
<p>Dépistage du cancer du sein Découvrez si vous avez un risque élevé de cancer du sein. Sinon, aucun dépistage n'est encore requis. Signalez sans délai à votre médecin ou au personnel infirmier si vous observez tout changement dans l'aspect ou la texture de vos seins.</p>	<p>Dépistage du cancer du sein Les femmes âgées de 40 à 44 ans devraient avoir le choix de commencer un dépistage du cancer du sein sous forme de mammographies annuelles, si elles le souhaitent. À partir de 45 ans, elles devraient passer une mammographie chaque année.</p>	<p>Dépistage du cancer du sein Passez une mammographie chaque année si vous avez entre 45 et 54 ans. À partir de 55 ans, vous pouvez passer une mammographie tous les deux ans ou continuer une fois par an. Le dépistage devrait continuer tant que vous êtes en bonne santé et que votre espérance de vie est d'au moins 10 ans.</p>	<p>Mammographie Une mammographie de dépistage est un examen radiologique utilisé pour détecter des signes de cancer du sein chez les femmes sans symptômes ou problèmes de seins.</p>
<p>Dépistage du cancer du col de l'utérus Les personnes âgées de 25 à 65 ans qui ont un col de l'utérus devraient passer un test de dépistage primaire du VPH tous les 5 ans. Si un test de dépistage primaire du VPH n'est pas disponible, un co-test peut être réalisé tous les 5 ans, ou un test Pap seul tous les 3 ans. Les personnes âgées de 66 ans ou plus qui ont passé des tests de dépistage réguliers dans les 10 années précédentes et dont les résultats étaient normaux ne doivent pas être testées. Les personnes qui ont eu des lésions précancéreuses graves du col de l'utérus doivent être testées pendant au moins 25 ans après ce diagnostic, même après l'âge de 65 ans. Les personnes dont le col et l'utérus ont été retirés chirurgicalement devraient arrêter le dépistage, sauf si le but de la chirurgie était de traiter un cancer du col ou une lésion précancéreuse grave. Les personnes vaccinées contre le VPH doivent continuer de suivre les recommandations de dépistage pour leur groupe d'âge.</p>			<p>Test Pap Le test Pap (ou frottis vaginal) recherche des changements ou anomalies cellulaires dans le col de l'utérus. Test du VPH Le test du virus du papillome humain (VPH) recherche la présence de ce virus et peut être réalisé en même temps que le test Pap. Test de dépistage primaire du VPH Il s'agit d'un test du VPH qui est réalisé seul pour le dépistage. Co-test Il s'agit d'un test combinant un test du VPH et un test Pap.</p>
		<p>Dépistage du cancer du poumon Si vous fumez actuellement ou avez fumé dans le passé, que vous avez entre 50 et 80 ans et que vous êtes à risque élevé de cancer du poumon (antécédents de tabagisme d'au moins 20 paquets-années), vous pourriez bénéficier d'un dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique à faible dose une fois par an.</p>	<p>Dépistage du cancer du poumon Les personnes qui fument et les anciens fumeurs ont un risque plus élevé de cancer du poumon. Discutez avec un médecin de votre risque de cancer du poumon et des avantages, limites et désavantages potentiels du dépistage d'un cancer du poumon précoce.</p>



En général, les assurances maladie couvrent les services de prévention et de dépistage. Veuillez vérifier votre couverture spécifique. Si vous n'avez pas d'assurance maladie ou que vous n'avez pas les moyens de payer le test de dépistage, consultez le site cancer.org/getscreened pour plus d'informations.

N'oubliez pas de signaler à votre médecin ou au personnel infirmier si vous avez eu un cancer de tout type ou si votre père, mère, frère, sœur ou enfant ont eu un cancer.

Il pourrait être nécessaire de commencer le dépistage de certains cancers plus tôt ou plus souvent si vous présentez certains facteurs de risque. Parlez-en avec votre médecin.

cancer.org | 1.800.227.2345